



## Fisa tehnica

**Denumire comerciala: HIGEEA ALCOOL GEL DEZINFECTANT**

**Compozitie chimica:**

**Substanta activa:** Alcool izopropilic (70%, numar CAS 67-63-0, Nr. CE 200-661-7 )

**Tip de produs biocid:**

Grupa principala 1

Tip de produs 1

**Domeniile de utilizare:**

Produse biocide utilizat pentru igiena umana, aplicat pe sau care intra in contact cu pielea umana in scopul principal de a o dezinfecta.

**Indicatii de utilizare:**

Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare;

Utilizare: se utilizeaza nediluat;

Timp de contact 60 secunde pentru eficacitate bactericida si 120 de secunde pentru eficacitate virucida.

**Forma de conditionare:** lichid vascos transparent;

**Mod de ambalare :** recipienti cu volumul de 150 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 L

**8. Conditii de pastrare, depozitare si eliminare:**

In dilutii mari produsul se poate evacua la canalizare. Cantitatile mai mari se absorb cu materiale absorbante (nisip).

A se pastra la temperaturi de 5-35°C, ferit de razele soarelui.

**9. Eficacitatea produsului HIGEEA ALCOOL GEL DEZINFECTANT**

Activitate	Metoda de testare	Specia/Tulpina de referinta	Conc.	Timp de actiune
Bactericida	SR EN 13727+A2	<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Stafilococcus aureus</i>	nediluat	60 secunde
Virucida	SR EN 14476+A2	<i>Poliovirus tip 1</i>	nediluat	120 secunde

**10. Categoria de utilizatori :**

Industriali, profesionali, populatie

**11. Indicatii privind**

**Periculozitatea :** Lichid și vapori foarte inflamabili, Provoacă o iritare gravă a ochilor, Poate provoca somnolență sau amețeală, A nu se lasa la îndemana copiilor ;

**si masurile de prim ajutor :**

- contact cu pielea : daca apare disconfort, se clateste cu apa din abundenta.
- contact cu ochii : se vor clati ochii cu apa din abundenta. Scoateti lentilele de contact daca exista. Se consulta un medic oftalmolog.
- înghițire : se va clati gura cu multa apa, nu se va bea nimic, se va cere ajutorul medicului. Nu se provoaca voma.
- inhalare: se va intrerupe contactul cu produsul si se va scoate la aer. Daca simptomele persista se va consulta de urgenta medicul.